

Bewertungsmatrix Nordfriesland Makrophytobenthos-Index								
Qualitätskategorien	Norm-EQR	0	1	2	3	4	Gewichtung %	Norm-EQR gemäß Gewichtung für 6-Jahre-Intervall
		Schlecht	Unbefriedigend	Mäßig	Gut	Sehr gut		
		0 – 0.2	0.2 – 0.4	0.4 – 0.6	0.6 – 0.8	0.8 – 1.0		
Modul Seegras ⁶	Eulitorale Fläche (%) ¹	0 - 2	3 - 6	7 - 14	15 - 29	30 - 100 ⁸	50	Mittelwerte aller Parameter-EQRs über 6 Jahre
	Anteil ≥ 60 % Bedeckung (%) ²	0 - 5	6 - 11	12 - 24	25 - 49	50 - 100	10	
	Präsenz beider Arten an Dauermessstellen (% von 7) ³	0 - 19	20 - 39	40 - 59	60 - 79	80 - 100	10	
Modul Grünalgen ⁷	Eulitorale Fläche (%) ⁴	100 - 25	24 - 13	12 - 7	6 - 4	3 - 0	20	
	Anteil ≥ 60 % Bedeckung (%) ⁵	100 - 50	49 - 25	24 - 12	11 - 6	5 - 0	10	

1 Seegraswiesen mit ≥ 20% Bedeckung auf 930 km² eulitoralere Fläche.

2 Flächenanteil von Seegraswiesen mit ≥ 20% Bedeckung, wo die Bedeckung ≥ 60% liegt.

3 Das 6-Jahre-Mittel kann durch Befunde der Gesamtkartierung korrigiert werden. Einzelfunde werden nicht berücksichtigt.

4 Grünalgenmatten mit ≥ 20% Bedeckung auf 930 km² eulitoralere Fläche.

5 Flächenanteil von Grünalgenmatten mit ≥ 20% Bedeckung, wo die Bedeckung ≥ 60% liegt.

6 Angaben beziehen sich auf das beobachtete Maximum der Wuchssaison eines Jahres (August / September).

7 Angaben beziehen sich auf das beobachtete Maximum der Wuchssaison eines Jahres (variabel zwischen Juni bis September).

8 Bei deutlich über 30% müsste eine grundlegende Neubewertung erfolgen.